

MANUAL DE CUIDADO DE HERIDOS EN COMBATE



GUÍA CIOMR
V3.1, 2017

16

9. mordeduras y picaduras

- hombre / animal → limpiar y cubrir
- serpiente → NO chupar o hacer cortes
- vendaje compresivo
- comprobar ABC
- picaduras → cubrir
- comprobar ABCs
- garrapatas → retirar con pinzas especiales
- marcar el sitio

10. mal de altura

- (falta de aire, mareo, confusión)
- bajar a los 2.000m

11. estrés de combate

- (rendición, suspicacia, miedo, alerta, hablador, temerario)
- desarmar
 - COMPROBAR LESIONES!
 - apoyo de compañeros
 - si ineficaz: evacuar

**AHORA PROCEDA CON:
PREVIENIENDO HIPOTERMIA, POSICIÓN, ALIVIO DEL DOLOR, MEDICACION, CONFORT (pág. 13);
RETIRADA DE MAPAS Y DOCUMENTOS;
COMUNICACIÓN / "NUEVE LINEAS";
REEVALUACIÓN Y RE-TRIAGE DE LA VÍCTIMA;
EVACUACIÓN (pág. 14)**

EVALUACIÓN / TRATAMIENTO de CADA VÍCTIMA (NUNCA BAJO EL FUEGO !)

EXAMEN INICIAL (Solamente en CTC !)

1. Detener los sangrados externos que amenacen la vida
 - **seguir las recomendaciones NACIONALES**
 - * presión directa, vendaje compresivo/hemostático
 - * torniquete, seg. torniquete, cerca de la herida
 - si se coloca torniquete: escribir "T" + hora en el baja evaluar el sangrado/pulso distal

2. Inmovilizar el cuello (trauma brusco) y gritarle
 - no respuesta, ojos cerrados, sin movimiento (inconsciente)

ir a pág. 7

- víctima responde (consciente)

ir a #3 "vía-aérea"

3. Preguntar qué le pasa ("A")

- voz clara:

ir a #4 "respiración"

- voz ronca / respiración ruidosa:
 - * permitir postura preferida
 - * inspeccionar boca

ir a #4 "respiración"

4. Comprobar respiración ("B")

- >30/min (o incapacidad para contar hasta 10): pensar en lesión en el tórax, explosión, shock
 - <10/min: pensar en lesión en la cabeza
 - cubrir heridas torácicas "soplates": vendaje hermético
 - seguir pautas nacionales sobre descompresión con aguja
- ir a #5 "circulación"

12

5

COMUNICACIÓN

Mensaje METHANE

- Mi nombre (quién llama)
- Localización Exacta (GPS, mapa coord, "descripción")
- Tipo de incidente (tiroteo, artefacto explosivo, etc)
- Hamenazas (material sin explotar, químicos, etc)
- Accesibilidad
- Número y tipo de víctimas / lesiones
- ayuda Esperada / requerida (helicóptero, ambulancia)

Traspaso ATMIST (para personal medico)

- Adulto <> niño
- Tiempo de evolución
- Mecanismo de lesión
- Lesiones encontradas y/o sospechadas
- Signos: vía aérea, frecuencia respiratoria y cardiaca, conciencia,
- Tratamiento administrado

EVACUACIÓN

- solicita evacuación siguiendo las pautas NATO (9 líneas, pag 15) o pautas nacionales
- re-examina la baja y haz re-triage después del tratamiento y re-triage (reclasificar) tras tratamiento
- evacuar según el orden: T1 (A,B,C), T2, T3
- arreactivo / torniquete / vía aérea quemada: son T1
- esto puede ser anulado por un escalón superior

MUERTE

- signos evidentes: decapitación, lividez, descomposición
- durante la asistencia: pérdida permanente de la actividad respiratoria y cardiaca
- en cualquier caso: retirar etiquetas y efectos personales **seguir las recomendaciones NACIONALES**
- no dejar a los muertos atrás

14

- quemada químicas → retirar ropa empapada: **cuidado!**
 - aclarar 30 minutos
 - cubrir quemaduras
- fósforo → aclarar
 - cubrir con gasa húmeda
 - **mantener húmeda!**
- eléctricas → desconectar fuente
 - cubrir heridas

4. ojos

- (dolor, enrojecimiento, mantenerlos cerrados) → aclarar (fuego, química) y proteger el otro ojo.
- cuerpos extraños → no retirar
 - cubrir el ojo sin presión;
 - preferiblemente con protección

5. "lesiones ocultas" (trauma brusco y explosión)

- tórax: le falta el aire, marcas externas
- abdomen: dolor, rigidez, marcas externas
 - evacuar

6. lesiones espinales

- (dolor cuello / espalda, hormigueo, parálisis) (confuso en víctimas inconscientes!)
 - inmovilizar columna si situación táctica lo permite y se dispone de equipo

NOTA: controlar la vía aérea y alejar a la víctima del peligro es prioritario frente a la inmovilización!

10

LÍNEAS MAESTRAS

Evaluación:

- Bajo fuego
- Entorno hostil
- Entorno seguro

1. Bajo fuego

(→ Cuidados bajo fuego)

- ganar / escapar
- no te autolesiones/ previene lesiones en la víctima
- pon a cubierto a la victim y aplica los primeros auxilios
- **detener sangrados externos que amenacen la vida**
 - * **seguir las recomendaciones NACIONALES**
 - * torniquete, (segundo torniquete), parte alta de miembro
- poner a la víctima inconsciente boca abajo
- **NO MÁS EXPLORACIONES O TRATAMIENTOS**
- no dejar a la víctima atrás
- **al cesar el fuego, reevaluar** **ver #2 debajo**

2. Entorno hostil

(→ Cuidados Tacticos de Campo)

- asegurar el área
- use equipo de protección personal
- desarma baja/s con alteración de conciencia
- valorar el número de víctimas
 - múltiples víctimas: triage, valora, trata **ir a pág. 4**
 - una víctima: valora, trata **ir a pág. 5**

3. Entorno seguro

(→ Cuidados Tacticos de Campo)

- tome precauciones de seguridad para
 - si mismo (use equipo de protección personal)
 - accidentados, víctima/víctimas
- desarma baja/s con alteración de conciencia
- valorar el número de víctimas
 - múltiples víctimas: triage, valora, trata **ir a pág. 4**
 - una víctima: valora, trata **ir a pág. 5**

3

VÍCTIMA INCONSCIENTE

La víctima no reacciona cuando se le grita (sin respuesta, ojos cerrados, sin movimiento)

- Abrir vía aérea (elevar barbilla)
- Inspeccionar boca, retirar restos (sangre, vómito, dientes) mediante barrido digital.
- Escuchar el paso del aire (máximo 10 segundos)
 - presente
 - *mantener vía aérea mediante vía nasofaríngea **siguiendo recomendaciones nacionales**
 - *y/o poner a la víctima en posición lateral de seguridad **Ir a pág. 5, #4 "respiración"**

- ausente en entorno hostil - seguramente víctima MUERTA
- si también hay trauma torácico **seguir pautas nacionales** sobre descompresión bilateral neumotorax a tensión
- ocasionalmente considerar SVB

en entorno seguro

Soporte Vital Básico


ir a pág. 8



Elevación de la barbilla

7

TRIAGE y TRATAMIENTO de MÚLTIPLES VÍCTIMAS
REALIZAR CUANDO HAYA 2 O MÁS VÍCTIMAS
PRIMERO TRIAGE, DESPUÉS TRATAR !!



AHORA evaluar y tratar a cada víctima individual

Empezar con T1 (A), luego T1 (B), T1 (C), T1 (D), T2, T3

ir a pág. 5

PREVENCION DE LA HIPOTERMIA

Cubrir toda las victimas usando cualquier medio disponible a tu alcance

POSICIÓN

NOTA: la posición depende también de la situación táctica.

1. Víctima consciente
 - en general: posición preferida por la víctima
 - vía aérea quemada: semisentada
 - lesiones del ojo: semisentada
 - lesiones torácicas: semisentada
 - lesiones abdominales: boca arriba, con las piernas flexionadas (si no hay lesiones en piernas o columna)
2. Víctima inconsciente
 - posición lateral de seguridad (PLS) **(siguiendo las recomendaciones NACIONALES)**
 - sobre el lado lesionado, salvo cuerpos extraños en él
 - boca arriba, protegiendo la vía aérea (elevar barbilla) (SOLO en entorno seguro)
 - lesiones en la cabeza: ligera elevación de la parte superior del cuerpo

ALIVIO DEL DOLOR, MEDICACION y CONFORT

- Primeros Auxilios buenos (ej. entablillar) alivian el dolor
- hablar SIEMPRE a la víctima
- analgesicos / alternativos y antibioticos: **SOLO recomendaciones NACIONALES**
- La morfina está prohibida en:
 - * inconsciencia
 - * lesiones en la cabeza
 - * dificultad respiratoria
- proteger a la víctima del tiempo
- no permitir a la víctima beber cuando el nivel de consciencia está disminuido, en otras situaciones beber está PERMITIDO

SOPORTE VITAL BÁSICO (SVB / BLS)

es apropiado en entorno SEGURO
 se podría considerar en entorno hostil

Víctima arreactiva; respiración ausente
 (NOTA: "boquear" equivale a ausencia de respiración)

1. Conseguir ayuda
2. Colocar el talón de una mano en la mitad inferior del esternón
3. Colocar la otra mano sobre la anterior
4. Compresiones torácicas perpendiculares.
 profundidad: 5-6 centímetros
 frecuencia: 100-120/minuto
5. Después de 30 compresiones, dar 2 insuflaciones (boca a boca) en máximo de 10 segundos.
 No esperar la segunda espiración: retomar las compresiones
6. Alternar 30 compresiones con 2 respiraciones
7. Continuar hasta:
 - víctima comienza a respirar / moverse
 - Agotamiento del socorrista
 - SVB pasa a cargo de otra persona
8. Si SVB tiene éxito pero la víctima permanece inconsciente
 - mantener vía aérea mediante vía nasofaríngea **siguiendo recomendaciones nacionales**
 - y/o poner a la víctima en posición lateral de seguridad

Ir a pág. 5,
 #4 "respiración"

EXAMEN SECUNDARIO (solamente en CTC !)
(AMPLITUD DEPENDE DE SITUACIÓN TÁCTICA!; la valoración puede ser pospuesta!)

1. **heridas** (buscar también heridas de salida!)
 - cubrir (considerar: hermético en tórax)
 - quitar anillos
 - salida de intestino → no reintroducirlo
 - usar gasa húmeda
 - cerebro a la vista → no comprimirlo
 - cuerpos extraños → no retirarlos
 - huesos → no reintroducirlos
2. **fracturas**
 (dolor, inmovilidad, posturas anormales; +/- herida)
 - aliviar dolor
 - inmovilizar (tablilla)
 - control pulso/ función antes/ después
 - cubrir heridas
3. **quemaduras**

Todas las quemaduras: - **seguir pautas nacionales** sobre accesos y fluidoterapia
 - prevenir hipotermia
 - estimar el área total de superficie corporal quemada

- por fuego → extinguir origen
- no retirar ropa adherida
- enfriar 10 minutos
- no abrir ampollas
- cubrir quemaduras
- **cuidado:** vía aérea